

POR QUE ES IMPORTANTE EL TRATAMIENTO DE LA INFECCION DE TUBERCULOSIS INACTIVA

Su salud y la salud de sus amigos y seres queridos es importante.

Has sido diagnosticado con una infección de tuberculosis (TB) inactiva, también llamada infección de tuberculosis latente (LTBI). La infección de tuberculosis inactiva no es contagiosa, pero puede convertirse en enfermedad de tuberculosis activa en cualquier momento. Tratar la infección de tuberculosis inactiva antes de que comiencen los síntomas ayudará a proteger su salud y la salud de quienes lo rodean.



Enfermedad de tuberculosis activa y sus problemas:

- Cuando una persona tiene la enfermedad de tuberculosis activa, la bacteria puede transmitirse a otras personas a través del aire y puede causar la infección de amigos y seres queridos.
- La enfermedad de tuberculosis es una enfermedad devastadora que afecta al trabajo y otras actividades y, si no se trata, puede causar la muerte.
- El tratamiento para la enfermedad de tuberculosis activa dura de 6 meses a 18 meses y requiere visitas diarias, semanales y mensuales a la clínica de salud.

Infección de tuberculosis inactiva y prevención:

- Las personas con infección de tuberculosis inactiva no pueden transmitir la bacteria a otras personas a menos que su tuberculosis se active (comiencen a tener síntomas).
- Para evitar la enfermedad de tuberculosis activa, su proveedor de atención médica le recetará un tratamiento para la LTBI.
- El tratamiento para la infección de tuberculosis inactiva es mucho más corto que la enfermedad de tuberculosis, y la mayoría tarda de 3 a 4 meses en completarse.
- Importante: La mayoría de las personas con infección de tuberculosis inactiva se convierten en enfermedad de tuberculosis activa durante los primeros dos años. Comenzar y completar el tratamiento con LTBI previene la progresión a la enfermedad de tuberculosis activa.

Escanee los códigos QR con la cámara de su teléfono celular o haga clic en los enlaces para obtener más información sobre el tratamiento de la enfermedad de tuberculosis y la LTBI:

1. *Efectos secundarios y cuándo llamar a su clínica de atención médica:* La información más importante para cualquiera de los tratamientos de LTBI se puede encontrar en el *Rastreador de tratamiento de LTBI: 4 meses de rifampicina*, abra el código QR a continuación para obtener esta hoja de información.

[CDC Lo que necesita saber sobre la tuberculosis](#)

LTBI Treatment Tracker: [Rastreador de tratamiento LTBI: rifampicina de 4 meses](#)



[Preguntas y respuestas de los CDC sobre la tuberculosis](#)

[Historias personales de los CDC sobre la tuberculosis](#)



Esta publicación fue apoyada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Estado de Nevada a través de la Subvención Número 5 NU52PS910224-05-00 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa necesariamente los puntos de vista oficiales del Departamento ni de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.